

## ПРО КАЛІБРУВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У КЛАСИЧНІЙ МЕХАНІЦІ

В. І. Третяк

*Інститут фізики конденсованих систем НАН України,*

*бул. Свєнціцького, 1, Львів, 290011, Україна*

(Отримано 3 листопада 1997 р.; в остаточному вигляді 26 травня 1998 р.)

Для класичної механічної системи з  $n$  ступенями вільності запропоновано правило побудови лагранжіана, що забезпечує калібрувальну інваріантність відносно довільної групи Лі.

**Ключові слова:** калібрувальна інваріантність, лагранжева механіка, квазікоординати.

PACS number(s): 03.20.+i; 11.15.-q; 11.30.-j

### I. ВСТУП

Калібрувальна теорія поля є наріжним каменем сьогоднішньої теоретичної фізики. Загальноприйнятим є уявлення, що всі фундаментальні взаємодії зумовлені калібрувальною інваріантністю відносно певних груп ( $U(1)$  у випадку електродинаміки,  $U(1) \times SU(2)$  для об'єднаної теорії електро-слабкої взаємодії,  $SU(3)$  для сильної взаємодії). Вра жаючі успіхи, досягнуті в останні десятиліття на шляху уніфікованого опису всіх відомих взаємодій, значною мірою зумовлені винятковою нетривіальністю і гнучкістю відповідного математичного апарату та глибоким взаємопроникненням чисто математичних і фізичних концепцій. Тому дослідження структур, пов'язаних з різними аспектами калібрувальної інваріантності, становить актуальну проблему як з огляду опрацювання загальних формальних методів, так і для ліпшого розуміння їхнього фізичного статусу.

У класичної теорії поля добре опрацьовано стандартний спосіб досягнення інваріантності відносно локальних перетворень, для яких інфінітезимальні параметри є функціями точки бази  $M$  волокнистої в'язки (fiber bundle)  $\pi : E \rightarrow M$  (звичайно такою базою служить простір Мінковського  $M = \mathbb{M}_4$ ) [1–3]. Нехай перерізи в'язки  $\pi$  описуються функціями  $\varphi^A(x)$ ,  $x \in M$ ,  $A = 1, \dots, k = \dim E - \dim M$ , а динаміка відповідної фізичної системи — густиною лагранжіана  $\mathcal{L}(\varphi^A(x), \partial_\mu \varphi^A(x))$ ,  $\partial_\mu \equiv \partial/\partial x^\mu$ ,  $\mu = 1, \dots, \dim M$ , інваріантною відносно  $r$ -параметричної групи Лі  $\mathcal{G}_r$ , яка діє на поля  $\varphi^A(x)$  лінійним чином:

$$\varphi^A(x) \mapsto \varphi^A(x) + \epsilon^\alpha(T_\alpha)_B^A \varphi^B(x), \quad \alpha = 1, \dots, r. \quad (1.1)$$

Тут  $\epsilon^\alpha$  — інфінітезимальні дійсні параметри,  $T_\alpha$  — матриці  $k$ -вимірного зображення (можливо, звідного) алгебри Лі групи  $\mathcal{G}_r$ , які задоволяють комутаційні співвідношення

$$[T_\alpha, T_\beta] = c_{\alpha\beta}^\gamma T_\gamma, \quad \alpha, \beta, \gamma = 1, \dots, r, \quad (1.2)$$

зі структурними константами  $c_{\alpha\beta}^\gamma$ . За індексами, що повторюються, розуміють підсумовування.

Інваріантності відносно локальних (або калібрувальних) перетворень із заміною в (1.1) параметрів  $\epsilon^\alpha$  довільними функціями  $\epsilon^\alpha(x)$  досягають уведенням калібрувальних полів  $A_\mu^\alpha(x)$  та переходом від  $\mathcal{L}(\varphi^A(x), \partial_\mu \varphi^A(x))$  до

$$\mathcal{L}_g = \mathcal{L}(\varphi^A(x), \mathcal{D}_\mu \varphi^A(x)) - \frac{1}{4} G_{\mu\nu}^\alpha G_\alpha^{\mu\nu}, \quad (1.3)$$

де коваріантна похідна  $\mathcal{D}_\mu$  означена співвідношенням

$$\mathcal{D}_\mu \varphi^A(x) \equiv \partial_\mu \varphi^A(x) - g(T_\alpha)_B^A A_\mu^\alpha(x) \varphi^B(x); \quad (1.4)$$

$$G_{\mu\nu}^\alpha \equiv \partial_\mu A_\nu^\alpha - \partial_\nu A_\mu^\alpha - g c_{\alpha\beta}^\gamma A_\mu^\beta A_\nu^\gamma \quad (1.5)$$

і  $g$  — довільна стала. Трансформаційні властивості калібрувальних полів  $A_\mu^\alpha(x)$  постулюють у вигляді

$$A_\mu^\alpha(x) \mapsto A_\mu^\alpha(x) + \epsilon^\gamma(x) c_{\gamma\beta}^\alpha A_\mu^\beta(x) + g^{-1} \partial_\mu \epsilon^\alpha(x). \quad (1.6)$$

Цікаво розглянути аналогічну проблему в рамках класичної механіки. Тут базовий многовид  $M = \mathbb{R}$  одновимірний, що значно спрощує ситуацію, дозволяючи “протінегратувати” співвідношення (1.6), позбуваючись члена з  $\partial_\mu \epsilon^\alpha(x)$ . Поряд з тим у цьому випадку порівняно легко розглянути довільну дію групи  $\mathcal{G}_r$  у тотальному просторі  $E$  в'язки  $\pi$ , включаючи (не обов'язково лінійні) перетворення, що діють на базі й навіть переміщують базу і шари. Зауважимо, що в теорії поля розгляд як калібрувальної групи перетворень бази — конкретно групи Пуанкаре — необхідний елемент побудови калібрувальної теорії тяжіння [4].

### II. УМОВИ КАЛІБРУВАЛЬНОЇ ІНВАРИАНТНОСТІ

Розглянемо лагранжеву динамічну систему  $(\pi, L, \mathcal{G}_r)$ , де:  $\pi : E \rightarrow \mathbb{R}$  — (тривіяльна) волокниста в'язка, перерізи якої описують рухи цієї системи;

$L : J^1\pi \rightarrow \mathbb{R}$  — функція Лагранжа, задана на 1-дженеті  $J^1\pi$  в'язки  $\pi$ ;

$\mathcal{G}_r$  — група симетрії системи.

Нехай  $(t, x^i)$ ,  $i = 1, \dots, \dim E - 1$ , — локальні координати в  $E$ ;  $(t, x^i, \dot{x}^i)$  — координати в  $J^1\pi$ , так що локально  $L = L(t, x, \dot{x})$ , а дія групи  $\mathcal{G}_r$  в  $E$  має вигляд (інфінітезимально)

$$\begin{aligned} t &\mapsto t + \epsilon^\alpha \eta_\alpha(t, x) + o(\epsilon), \\ x^i &\mapsto x^i + \epsilon^\alpha \zeta_\alpha^i(t, x) + o(\epsilon); \quad \alpha = 1, \dots, r. \end{aligned} \quad (2.1)$$

(див. [5–7]). Векторні поля на  $E$

$$\mathcal{X}_\alpha = \eta_\alpha \frac{\partial}{\partial t} + \zeta_\alpha^i \frac{\partial}{\partial x^i} \quad (2.2)$$

задовільняють комутаційні співвідношення алгебри Лі групи  $\mathcal{G}_r$ ,

$$[\mathcal{X}_\alpha, \mathcal{X}_\beta] = c_{\alpha\beta}^\gamma \mathcal{X}_\gamma. \quad (2.3)$$

Це означає, що функції  $\eta_\alpha$ ,  $\zeta_\alpha^i$  задовільняють систему рівнянь

$$\begin{aligned} \mathcal{X}_\alpha \eta_\beta - \mathcal{X}_\beta \eta_\alpha &= c_{\alpha\beta}^\gamma \eta_\gamma, \\ \mathcal{X}_\alpha \zeta_\beta^i - \mathcal{X}_\beta \zeta_\alpha^i &= c_{\alpha\beta}^\gamma \zeta_\gamma^i. \end{aligned} \quad (2.4)$$

Навпаки, кожен розв'язок цієї системи дає змогу побудувати скінченне перетворення

$$\begin{aligned} t &\mapsto t'(t, x, \epsilon) \equiv \exp(\epsilon^\alpha \mathcal{X}_\alpha) t, \\ x^i &\mapsto x^{i'}(t, x, \epsilon) \equiv \exp(\epsilon^\alpha \mathcal{X}_\alpha) x^i, \end{aligned} \quad (2.5)$$

яке для малих  $\epsilon$  матиме вигляд (2.1) [7, 8].

Векторні поля  $\mathcal{X}_\alpha$  можна стандартним чином продовжити на  $J^1\pi$ :

$$X_\alpha = \mathcal{X}_\alpha + (D\zeta_\alpha^i - v^i D\eta_\alpha) \frac{\partial}{\partial v^i}, \quad (2.6)$$

де  $v^i \equiv \dot{x}^i$  та

$$D \equiv \frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + v^i \frac{\partial}{\partial x^i}. \quad (2.7)$$

Поля  $X_\alpha$  задовільняють ті ж комутаційні співвідношення, що й  $\mathcal{X}_\alpha$ . Умови симетрії лагранжевого опису відносно групи  $\mathcal{G}_r$  виражаються системою диференційних рівнянь першого порядку на функцію Лагранжа  $L$  [6, 8]:

$$X_\alpha L + LD\eta_\alpha = 0. \quad (2.8)$$

Якщо тепер уважати, що параметри  $\epsilon^\alpha$  в перетвореннях (2.1) залежать від  $t$ ,  $\epsilon^\alpha = \epsilon^\alpha(t)$ , то умов (2.8) уже не досить для забезпечення інваріантності лагранжевого опису: вирази, що визначають зміну форми  $L dt$ , будуть у цьому випадку поряд з  $\epsilon^\alpha(t)$  містити члени, пропорційні до  $\dot{\epsilon}^\alpha = d\epsilon^\alpha/dt$ . Прирівнювання останніх до нуля дасть додаткові співвідношення виду

$$Y_\alpha L + L\eta_\alpha = 0, \quad (2.9)$$

де

$$Y_\alpha = (\zeta_\alpha^i - v^i \eta_\alpha) \frac{\partial}{\partial v^i}. \quad (2.10)$$

### ІІІ. РОЗВ'ЯЗОК УМОВ ІНВАРІАНТНОСТИ

Спробуємо задоволити  $r$  додаткових співвідношень (2.9) уведенням у лагранжіан  $r$  нових змінних  $\lambda^\alpha$ ,  $\alpha = 1, \dots, r$ . Таким чином, замість  $\pi : E \rightarrow \mathbb{R}$  ми розглядаємо в'язку  $\pi' : E' \rightarrow \mathbb{R}$  з  $\dim E' = \dim E + r$ , замість  $L$  — лагранжіан  $L' : J^1\pi' \rightarrow \mathbb{R}$ , заданий на 1-дженеті в'язки  $\pi'$ . Якщо  $(t, x^i, \lambda^\alpha)$  — локальні координати в  $E'$ , то  $(t, x^i, v^i, \lambda^\alpha, \dot{\lambda}^\alpha)$  позначатимуть локальні координати в  $J^1\pi'$ ; і дія групи  $\mathcal{G}_r$  в  $E'$  визначатиметься поряд з формулами (2.1) ще й трансформаційними властивостями змінних  $\lambda^\alpha$ :

$$\lambda^\alpha \mapsto \lambda^\alpha + \epsilon^\beta \sigma_\beta^\alpha(t, x, \lambda) + o(\epsilon), \quad (3.1)$$

де  $\sigma_\beta^\alpha(t, x, \lambda)$  — деякі функції, що будуть визначені нижче.

Базу алгебри Лі групи  $\mathcal{G}_r$  у модулі векторних полів на  $E'$  задаватимуть поля

$$\mathcal{X}'_\alpha = \mathcal{X}_\alpha + \sigma_\beta^\alpha \frac{\partial}{\partial \lambda^\beta}. \quad (3.2)$$

Прийнявши, що

$$\sigma_\beta^\alpha(t, x, \lambda) = \sigma_\beta^\alpha(\lambda), \quad (3.3)$$

отримаємо, що для виконання комутаційних співвідношень (2.3) для полів  $\mathcal{X}'_\alpha$  ці функції повинні задовільнити співвідношення

$$\sigma_\alpha^\gamma \frac{\partial \sigma_\beta^\delta}{\partial \lambda^\gamma} - \sigma_\beta^\gamma \frac{\partial \sigma_\alpha^\delta}{\partial \lambda^\gamma} = c_{\alpha\beta}^\gamma \sigma_\gamma^\delta. \quad (3.4)$$

Продовження полів  $\mathcal{X}'_\alpha$  на  $J^1\pi'$  дає векторні поля

$$X'_\alpha = X_\alpha + \sigma_\alpha^\beta \frac{\partial}{\partial \lambda^\beta} + (D\sigma_\alpha^\beta - \dot{\lambda}^\beta D\eta_\alpha) \frac{\partial}{\partial \dot{\lambda}^\beta}, \quad (3.5)$$

і умови інваріантності набудуть вигляду

$$X'_\alpha L' + L'D\eta_\alpha = 0, \quad (3.6)$$

$$Y'_\alpha L' + L'\eta_\alpha = 0, \quad (3.7)$$

де

$$Y'_\alpha \equiv Y_\alpha + (\sigma_\beta^\alpha - \dot{\lambda}^\beta \eta_\alpha) \frac{\partial}{\partial \dot{\lambda}^\beta}. \quad (3.8)$$

Розглянемо рівняння (3.7):

$$(\zeta_\alpha^i - v^i \eta_\alpha) \frac{\partial L'}{\partial v^i} + (\sigma_\beta^\alpha - \dot{\lambda}^\beta \eta_\alpha) \frac{\partial L'}{\partial \dot{\lambda}^\beta} + L' \eta_\alpha = 0. \quad (3.9)$$

Припустимо, що матриця  $\hat{\sigma} = \|\sigma_\beta^\alpha\|$  невироджена,

$$\det \|\sigma_\beta^\alpha\| \neq 0, \quad (3.10)$$

і введемо обернену до неї матрицю  $\|\kappa_\beta^\alpha\|$ :

$$\sigma_\gamma^\alpha \kappa_\beta^\gamma = \delta_\beta^\alpha. \quad (3.11)$$

Підставляння

$$L' = (1 - \eta_\alpha \kappa_\beta^\alpha \dot{\lambda}^\beta) F \quad (3.12)$$

приводить (3.9) до однорідної системи рівнянь для функції  $F$ :

$$(\zeta_\alpha^i - v^i \eta_\alpha) \frac{\partial F}{\partial v^i} + (\sigma_\beta^\alpha - \dot{\lambda}^\beta \eta_\alpha) \frac{\partial F}{\partial \dot{\lambda}^\beta} = 0. \quad (3.13)$$

Ця система  $r$  рівнянь для функції  $F$  від  $1+2(\dim E+r)$  аргументів має  $1+2\dim E+r$  перших інтегралів [9], якими є  $t$ ,  $x^i$ ,  $\lambda^\alpha$  (бо за ними немає похідних) і “коваріантні похідні” від координат

$$V^i = \frac{v^i - \zeta_\alpha^i \kappa_\beta^\alpha \dot{\lambda}^\beta}{1 - \eta_\alpha \kappa_\beta^\alpha \dot{\lambda}^\beta}. \quad (3.14)$$

Коли ввести позначення

$$\omega^\alpha \equiv \kappa_\beta^\alpha \dot{\lambda}^\beta, \quad (3.15)$$

$$f \equiv 1 - \eta_\alpha \omega^\alpha, \quad (3.16)$$

то формула для  $V^i$  набуде вигляду

$$V^i = f^{-1}(v^i - \zeta_\alpha^i \omega^\alpha), \quad (3.17)$$

і загальний розв'язок системи (3.9) можна подати як

$$L' = f F(t, x^i, V^i, \lambda^\alpha), \quad (3.18)$$

де  $F$  — довільна функція вказаних аргументів.

Тепер слід підставити вираз (3.18) у рівняння (3.6). Але попередньо варто розрахувати дію  $X'_\alpha$  на величини  $\omega^\alpha$  і  $f$ .

З означення (3.15) маємо

$$\begin{aligned} X'_\alpha \omega^\beta &= \kappa_\gamma^\beta (D\sigma_\alpha^\gamma - \dot{\lambda}^\gamma D\eta_\alpha) + \dot{\lambda}^\gamma X'_\alpha \kappa_\gamma^\beta = \\ &= \dot{\lambda}^\gamma \left( \kappa_\delta^\beta \frac{\partial \sigma_\alpha^\delta}{\partial \lambda^\gamma} + \sigma_\alpha^\delta \frac{\partial \kappa_\gamma^\beta}{\partial \lambda^\delta} \right) - \omega^\beta D\eta_\alpha. \end{aligned} \quad (3.19)$$

За допомогою (3.4) і (3.11) можна вивести формулу

$$\kappa_\delta^\beta \frac{\partial \sigma_\alpha^\delta}{\partial \lambda^\gamma} + \sigma_\alpha^\delta \frac{\partial \kappa_\gamma^\beta}{\partial \lambda^\delta} = -c_{\alpha\delta}^\beta \kappa_\gamma^\delta, \quad (3.20)$$

так що отримуємо

$$X'_\alpha \omega^\beta = c_{\gamma\alpha}^\beta \omega^\gamma - \omega^\beta D\eta_\alpha. \quad (3.21)$$

Враховуючи (3.21), маємо

$$X'_\alpha f = -\omega^\beta (\mathcal{X}_\alpha \eta_\beta - c_{\alpha\beta}^\gamma \eta_\gamma) + \eta_\beta \omega^\beta D\eta_\alpha, \quad (3.22)$$

або, беручи до уваги першу з формул (2.4),

$$X'_\alpha f = -\omega^\beta (\zeta_\beta^i - v^i \eta_\beta) \frac{\partial \eta_\alpha}{\partial x^i}, \quad (3.23)$$

що за допомогою означення (3.14) коваріантної похідної  $V^i$  можна подати у вигляді

$$X'_\alpha f = f (V^i - v^i) \frac{\partial \eta_\alpha}{\partial x^i} = f (\mathcal{D} - D) \eta_\alpha, \quad (3.24)$$

де  $\mathcal{D}$  — “коваріантна похідна за часом”,

$$\mathcal{D} \equiv \frac{\partial}{\partial t} + V^i \frac{\partial}{\partial x^i}. \quad (3.25)$$

Результат (3.24) показує, що підставляння (3.18) у рівняння (3.6) приведе до співвідношення

$$X'_\alpha F + F \mathcal{D} \eta_\alpha = 0. \quad (3.26)$$

Безпосереднім розрахунком з використанням формул (3.24), (3.21) і (3.4) отримуємо

$$X'_\alpha V^i = \mathcal{D} \zeta_\alpha^i - V^i \mathcal{D} \eta_\alpha. \quad (3.27)$$

Тому рівняння (3.26) набуде вигляду

$$\begin{aligned} \eta_\alpha \frac{\partial F}{\partial t} + \zeta_\alpha^i \frac{\partial F}{\partial x^i} + (\mathcal{D}\zeta_\alpha^i - V^i \mathcal{D}\eta_\alpha) \zeta_\alpha^i \frac{\partial F}{\partial V^i} \\ + \sigma_\alpha^\beta \frac{\partial F}{\partial \lambda^\beta} + F \mathcal{D}\eta_\alpha = 0. \end{aligned} \quad (3.28)$$

При  $\partial F / \partial \lambda^\alpha = 0$  це рівняння відрізняється від (2.8) тільки заміною швидкостей  $v^i$  на коваріантні похідні  $V^i$ . Таким чином, можна покласти

$$F = L(t, x^i, V^i), \quad (3.29)$$

де  $L(t, x^i, v^i)$  — функція Лагранжа вихідної системи, що задовільняє умови інваріантності відносно групи  $\mathcal{G}_r$ . Зазначимо, що залежність від  $\lambda^\alpha$  у функції  $F$  виявляється лише через посередництво “коваріантної похідної”  $V^i$ .

Отже, рецепт досягнення калібрувальної інваріантності відносно групи  $\mathcal{G}_r$  можна сформулювати так: у лагранжіані, що забезпечує інваріантність відносно групи (глобальних) перетворень  $\mathcal{G}_r$ , слід замінити швидкості  $v^i$  на коваріантні похідні  $V^i$  та домножити результат на фактор  $f$ :

$$L' = f L(t, x^i, V^i). \quad (3.30)$$

Якщо група  $\mathcal{G}_r$  діє тривіально на базі  $\mathbb{R}$  в'язки  $\pi$  ( $\eta_\alpha = 0$ ), то  $f = 1$ .

#### IV. КАЛІБРУВАЛЬНІ ЗМІННІ ТА КВАЗІКООРДИНАТИ

Розглянемо зміст уведених додаткових змінних  $\lambda^\alpha$ . Для цього звернемося до співвідношень (3.4), (3.10). Третя теорема Лі (див., наприклад, [10]) стверджує для кожного тензора структурних констант  $c_{\alpha\beta}^\gamma$  існування розв'язку системи (3.4) з початковою умовою

$$\sigma_\beta^\alpha(0) = \delta_\beta^\alpha, \quad (4.1)$$

так що принаймні для малих  $\lambda$  буде виконуватись умова (3.10). При цьому  $\lambda^\alpha$  — канонічні координати групи  $\mathcal{G}_r$ . Таким чином, тотальній простір  $E'$  введеної в'язки  $\pi'$  має вигляд

$$E' = E \times \mathcal{G}_r. \quad (4.2)$$

Функції  $\sigma_\beta^\alpha(\lambda)$  можна розрахувати за відомим законом композиції групи  $\mathcal{G}_r$  — функціями  $\varphi^\alpha(\lambda, \epsilon)$ , що означаються співвідношенням

$$\exp(\lambda^\alpha \mathcal{X}_\alpha) \circ \exp(\epsilon^\beta \mathcal{X}_\beta) = \exp(\varphi^\alpha(\lambda, \epsilon) \mathcal{X}_\alpha). \quad (4.3)$$

Відповідна формула має вигляд [10]:

$$\sigma_\beta^\alpha(\lambda) = \left. \frac{\partial \varphi^\alpha(\lambda, \epsilon)}{\partial \epsilon^\beta} \right|_{\epsilon=0}. \quad (4.4)$$

Віднотуємо, що для абелевої групи ( $c_{\alpha\beta}^\gamma = 0$ ), коли

$$\varphi^\alpha(\lambda, \epsilon) = \lambda^\alpha + \epsilon^\alpha, \quad (4.5)$$

маємо

$$\sigma_\beta^\alpha = \kappa_\beta^\alpha = \delta_\beta^\alpha. \quad (4.6)$$

Змінні  $\lambda^\alpha, \dot{\lambda}^\alpha$  входять у лагранжіан (3.30) лише в комбінації  $\kappa_\beta^\alpha \dot{\lambda}^\beta = \omega^\alpha$ . Тому доцільно перейти до “квазікоординат”, здійснивши таке перетворення  $J^1\pi'$ :

$$(t, x^i, v^i, \lambda^\alpha, \dot{\lambda}^\alpha) \mapsto (t, x^i, v^i, \lambda^\alpha, \omega^\alpha). \quad (4.7)$$

Це перетворення не зберігає структури тих рівнянь Ойлера-Лагранжа, які містять похідні за  $\lambda$ . Якщо в старих змінних  $(\lambda^\alpha, \dot{\lambda}^\alpha)$  вони мають вигляд

$$\frac{\partial L'}{\partial \lambda^\alpha} - D \frac{\partial L'}{\partial \dot{\lambda}^\alpha} = 0, \quad (4.8)$$

то, переходячи до нових змінних  $(\lambda^\alpha, \omega^\alpha)$ , враховуючи (3.15) і те, що у нових змінних  $L'$  не залежить від  $\lambda^\alpha$ , одержимо

$$\dot{\lambda}^\gamma \left( \frac{\partial \kappa_\gamma^\beta}{\partial \lambda^\alpha} - \frac{\partial \kappa_\alpha^\beta}{\partial \lambda^\gamma} \right) \frac{\partial L'}{\partial \omega^\beta} - \kappa_\alpha^\beta D \frac{\partial L'}{\partial \omega^\beta} = 0. \quad (4.9)$$

Домноживши (4.9) на невироджену матрицю  $\hat{\sigma}$ , отримаємо рівняння Ойлера-Лагранжа в термінах квазікоординат:

$$c_{\alpha\beta}^\gamma \omega^\beta \frac{\partial L'}{\partial \omega^\gamma} + D \frac{\partial L'}{\partial \omega^\alpha} = 0 \quad (4.10)$$

(пор., наприклад, [11]).

“Квазішвидкості”  $\omega^\alpha$  власне є аналогом калібрувальних полів  $A_\mu^\alpha(x)$  класичної теорії поля. Формула (3.17) для коваріантної похідної у випадку

$$\eta_\alpha = 0, \quad \zeta_\alpha^i = (T_\alpha)_j^i x^j, \quad (4.11)$$

що відповідає (1.1), набуде вигляду (коли ще провести заміну  $\omega^\alpha \mapsto g\omega^\alpha$ ,  $g$  — константа)

$$V^i = v^i - g(T_\alpha)_j^i x^j \omega^\alpha \quad (4.12)$$

або

$$\mathcal{D}x^i = Dx^i - g(T_\alpha)_j^i \omega^\alpha x^j, \quad (4.13)$$

що узгоджується з (4.4).

Трансформаційні властивості величин  $\omega^\alpha$  можна вивести таким чином. При інфінітезимальних перетвореннях (3.1) із залежними від  $t$  параметрами  $\epsilon^\alpha$  похідні  $\dot{\lambda}^\alpha$  перетворюються за правилом

$$\dot{\lambda}^\alpha \mapsto \dot{\lambda}^\alpha + \epsilon^\beta (D\sigma_\beta^\alpha - \dot{\lambda}^\alpha D\eta_\beta) + \dot{\epsilon}^\beta (\sigma_\beta^\alpha - \lambda^\alpha \eta_\beta). \quad (4.14)$$

Звідси випливає, що величини  $\omega^\alpha$  перетворюються як

$$\omega^\alpha \mapsto \omega^\alpha + \epsilon^\beta X'_\beta \omega^\alpha + g^{-1} \dot{\epsilon}^\beta \kappa_\gamma^\alpha (\sigma_\beta^\gamma - \lambda^\gamma \eta_\beta), \quad (4.15)$$

або, враховуючи формули (3.21) і (3.11),

$$\omega^\alpha \mapsto \omega^\alpha + \epsilon^\gamma (c_{\beta\gamma}^\alpha \omega^\beta - \omega^\alpha D\eta_\gamma) + g^{-1} \dot{\epsilon}^\beta (\delta_\beta^\alpha - g\omega^\alpha \eta_\beta), \quad (4.16)$$

що узгоджується з формулою (1.6) для калібрувальних полів.

Таким чином, екзотичний доданок у трансформаційних властивостях калібрувальних полів, пропорційний до  $\partial_\mu \epsilon^\alpha$ , у випадку одновимірної бази є наслідком використання квазішвидкостей.

Різниця між похідними  $\dot{\lambda}^\alpha$  і квазішвидкостями  $\omega^\alpha$  зникає для абелевих груп (див. (4.6)).

Зауважимо, що у випадку класичної механіки немає жодного відповідника власного лагранжіана калібрувального поля типу другого доданка у формулі (1.3): коли  $\dim M = 1$ , тензор кривини (1.5) є тотожним нулем.

## V. ПРИКЛАДИ

### A. Параметрична (хронометрична) інваріантність

Нехай  $\mathcal{G}_1 = T_0$  — однопараметрична група зсувів за  $t$ :

$$t \mapsto t + \epsilon, \quad x^i \mapsto x^i, \quad (5.1)$$

так що у (2.1)  $\eta = 1$ ,  $\zeta^i = 0$  і, як для кожної абелової групи,  $\hat{\sigma} = \hat{\kappa} = I$ . Загальний вигляд лагранжіана, що забезпечує інваріантність відносно глобальних перетворень (5.1), є

$$L = L(x^i, v^i). \quad (5.2)$$

Відповідні калібрувальні перетворення

$$t \mapsto t + \epsilon(t), \quad x^i \mapsto x^i, \quad (5.3)$$

описують довільну зміну параметра еволюції  $t$ . За правилом (3.30) знаходимо калібрувально-інваріантний лагранжіан

$$L' = (1 - \dot{\lambda}) L \left( x^i, \frac{v^i}{1 - \dot{\lambda}} \right). \quad (5.4)$$

Згідно (3.1), калібрувальна змінна  $\lambda$  при перетвореннях (5.3) міняється за правилом

$$\lambda \mapsto \lambda + \epsilon(t). \quad (5.5)$$

Якщо замість  $\lambda$  ввести нову змінну

$$x^0 = t - \lambda, \quad (5.6)$$

яка відповідно до (5.3) і (5.5) буде інваріантом відносно калібрувальних перетворень, то лагранжіан (5.4) можна подати у вигляді

$$L' = \dot{x}^0 L(x^i, v^i / \dot{x}^0), \quad (5.7)$$

тобто в стандартній формі, що забезпечує хронометричну інваріантність за рахунок однорідності першого порядку за першими похідними (див., наприклад, [12]).

Так, нерелятивістичному вільночастинковому лагранжіанові

$$L = \frac{mv^2}{2} \quad (5.8)$$

відповідає хронометрично-інваріантний вираз [13]

$$L' = \frac{mv^2}{2\dot{x}^0}, \quad (5.9)$$

а релятивістичній вільній частинці з

$$L = -m\sqrt{1 - v^2} \quad (5.10)$$

$(c = 1)$  — лагранжіан Планка (див. [14])

$$L' = -m\sqrt{(\dot{x}^0)^2 - v^2} \equiv -m\sqrt{\eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu}, \quad (5.11)$$

де  $u^\mu \equiv \dot{x}^\mu$ ,  $\mu = 0, 1, 2, 3$  і  $\|\eta_{\mu\nu}\| = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$  — стандартна метрика Мінковського. Таким чином, переход від тривимірного до чотиривимірного опису можна трактувати як спосіб забезпечення явної хронометричної інваріантності формалізму. Він однаково добре застосовний як у релятивістичній (Пуанкаре-інваріантній) механіці, так і в Галілей-інваріантній (“нерелятивістичній”). Дію групи Галілея можна задати в 4-вимірному просторі  $M_4$  з координатами  $x^\mu$ , як і дію групи Пуанкаре, з тою

лише відмінністю, що група Галілея не зберігатиме метрики Мінковського. На цьому шляху можна побудувати послідовний чотиривимірний опис Галілей-інваріантної механіки [13, 15]. Більше того, останнім часом значний інтерес викликає побудова класичної теорії поля в  $\mathbb{M}_4$ , базованої на калібрувальній інваріантності відносно групи Галілея [16, 17], як з огляду на її внутрішню узгодженість, так і з потреби послідовного розгляду ньютонівської та пост-ニュтонівської межі релятивістичної калібрувальної теорії тяжіння, яку отримують шляхом калібрування групи Пуанкаре.

Користуючись тим, що калібрувально-інваріантний лагранжіан (5.4) не визначає закону еволюції калібрувальної змінної  $\lambda$ , а отже, і пов'язаної з нею формулою (5.6) величини  $x^0$ , останню можна пов'язати з  $t, \mathbf{x}$  співвідношенням виду  $x^0 = \varphi(t, \mathbf{x})$ . Його підставлення у (5.11) приводить до виразу [18–20]

$$L = -m\sqrt{(D\varphi)^2 - v^2}, \quad (5.12)$$

який забезпечує лагранжів опис вільної релятивістичної частинки в довільній формі динаміки Дірака [21]. Лише при  $\varphi(t, \mathbf{x}) = t$  ми приходимо до стандартного виразу (5.10), який відповідає миттєвій формі динаміки.

## B. Неінерціяльні системи відліку

Нехай  $n = 3$  і  $\mathcal{G}_6 = e(3)$  — евклідова група трансляцій та поворотів

$$t \mapsto t, \quad \mathbf{x} \mapsto \mathbf{x} + \epsilon_R \times \mathbf{x} + \epsilon_T. \quad (5.13)$$

Вираз (3.30), який відповідає евклідово-інваріантному лагранжіанові  $L = L(\mathbf{v}^2)$ , має вигляд

$$L' = L([\mathbf{v} - \boldsymbol{\omega}_R \times \mathbf{x} - \dot{\boldsymbol{\lambda}}_T]^2) \quad (5.14)$$

і описує вільну частинку з погляду неінерціяльної системи відліку, що рухається з лінійною швидкістю  $\dot{\boldsymbol{\lambda}}_T(t)$  і кутовою швидкістю  $\boldsymbol{\omega}_R(t)$  [22]. Розрахунок  $\omega_R^i$  за формулою (3.15) з функціями  $\kappa_\beta^\alpha$ ;  $i, j = 1, 2, 3$ , що відповідають групі  $SO(3)$ , приводить до відомих виразів для кутової швидкості в термінах кутів Ойлера [23], які можна вважати канонічними кординатами  $\lambda^i$  групи  $SO(3)$ .

## C. Масштабні перетворення

Як приклад групи, що діє одночасно в базі та шарах, розглянемо однопараметричну групу масштаб-

них перетворень

$$t \mapsto t(1 + \epsilon), \quad x^i \mapsto x^i(1 + \epsilon). \quad (5.15)$$

Умови інваріантності (2.8) для перетворень (5.15) мають розв'язок

$$L = t^{-1}F(t^{-1}x^i, v^i); \quad (5.16)$$

з довільною функцією  $F$ . Відповідний калібрувально-інваріантний лагранжіан згідно з (3.30), (3.16), (3.17) має вигляд

$$L' = (t^{-1} - \dot{\lambda})F\left(\frac{x^i}{t}, \frac{v^i - x^i\dot{\lambda}}{1 - t\dot{\lambda}}\right), \quad (5.17)$$

де  $\lambda$  — калібрувальна змінна.

## VI. ПІДСУМКИ

Якщо  $\mathcal{G}_r$  —  $r$ -параметрична група симетрій класичної механічної системи, що описується лагранжіаном  $L = L(t, x, v)$ , то калібрувальної інваріантності досягаємо введеннем  $r$  додаткових змінних  $\lambda^\alpha$ ,  $\alpha = 1, \dots, r$ , які можна інтерпретувати як канонічні координати групи  $\mathcal{G}_r$ . При цьому для побудови калібрувально-інваріантного лагранжевого опису досить замінити в лагранжіані  $L = L(t, x, v)$  швидкості  $v^i$  на “коваріантні похідні”  $V^i$ , означені формулою (3.17), а у випадку, коли розглянуті перетворення міняють  $t$  — результат домножити на вираз (3.16). Додаткові змінні  $\lambda^\alpha$  входять у лагранжіан лише через квазишвидкості  $\omega^\alpha = \kappa_\beta^\alpha \dot{\lambda}^\beta$ , де матриця  $\kappa_\beta^\alpha$  визначається законом композиції групи  $\mathcal{G}_r$ . Рівняння Ойлера–Лагранжа для змінних  $\lambda^\alpha$  є наслідками рівнянь руху для змінних  $x^i$ , так що часова еволюція калібрувальних величин  $\lambda^\alpha = \lambda^\alpha(t)$  лишається повністю невизначеною. У результаті приходимо до виродженої лагранжевої системи [24], канонічний опис якої, як і наступне квантування, можуть будуватися на основі діракового гамільтонового формалізму з в'язями [25, 26]. Розглянуті приклади, в яких у ролі  $\mathcal{G}_r$  виступають деякі підгрупи групи просторово–часових симетрій, дають змогу, зокрема, у дещо іншому світлі побачити добре відомі класичні результати. Викликає інтерес розгляд у цьому контексті групи Лоренца, особливо з погляду вивчення ефектів адіабатичної циклічної еволюції [27] у русі релятивістичної частинки [28].

Автор вдячний проф. Р. Гайді та Ю. Ключковському за їхній сталій інтерес до цієї роботи, що значною мірою зумовило її написання.

- [1] W. Drechsler, M. E. Mayer, *Fibre Bundle Techniques in Gauge Theories* (Springer, Berlin e.a., 1977).
- [2] A. Trautman, Bull. Acad. Pol. Sci. Ser. sci. phys. et astron. **27**, 7 (1979).
- [3] А. А. Славнов, Л. Д. Фаддеев, *Введение в квантовую теорию калибровочных полей* (Наука, Москва, 1978).
- [4] D. G. B. Edelen, Int. J. Theor. Phys. **24**, 659 (1985).
- [5] Ж. Поммаре, *Системы уравнений с частными производными и псевдогруппы Ли* (Мир, Москва, 1983).
- [6] Ю. И. Манин, Итоги науки и техники. Совр. проблемы математики **11**, 5 (1978).
- [7] E. C. G. Sudarshan, N. Mukunda, *Classical Dynamics: A Modern Perspective* (Wiley, N.Y. e.a., 1974).
- [8] Л. В. Овсянников, *Групповой анализ дифференциальных уравнений* (Наука, Москва, 1978).
- [9] Е. Гурса, *Інтегрування рівнянь з частинними похідними першого порядку* (Радянська школа, Київ, 1941).
- [10] М. М. Постников, *Группы и алгебры Ли* (Наука, Москва, 1982).
- [11] В. И. Арнольд, В. В. Козлов, А. И. Нейштадт, Итоги науки и техники. Совр. проблемы математики. Фундаментальные направления **3**, 5 (1985).
- [12] Я. А. Схоутен, *Тензорный анализ для физиков* (Наука, Москва, 1965).
- [13] P. Havas, Rev. Mod. Phys. **36**, 938 (1964).
- [14] В. Паули, *Теория относительности* (Наука, Москва, 1983).
- [15] P. Havas, in *Problems in the Foundations of Physics* (Springer, Berlin e.a., 1971), p. 31.
- [16] H. P. Künzle, Gen. Relativ. Gravit. **7**, 445 (1976).
- [17] R. De Pietri, L. Lusanna, M. Pauri, Class. Quantum Grav. **12**, 219, 255 (1995).
- [18] Р. П. Гайдя, Ю. Б. Ключковский, В. И. Третяк, Доп. Акад. Наук УРСР. Сер. А, № 5, 6 (1982).
- [19] В. И. Третяк, препринт ИТФ-82-88Р, Киев, 1982.
- [20] Р. П. Гайдя, Ю. Б. Ключковский, В. И. Третяк, Теор. мат. физ. **55**, 88 (1983).
- [21] P. A. M. Dirac, Rev. Mod. Phys. **21**, 392 (1949).
- [22] Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, *Механика* (Наука, Москва, 1973).
- [23] R. J. Finkelstein, *Nonrelativistic Mechanics* (Benjamin, London e.a., 1973).
- [24] P. A. M. Dirac, Can. J. Phys. **2**, 129 (1950).
- [25] П. Дирак, *Лекции по квантовой механике* (Мир, Москва, 1968).
- [26] M. J. Gotay, J. M. Nester, Ann. Inst. Henri Poincaré, A **30**, 129 (1979); **32**, 1 (1980).
- [27] M. Berry, Proc. R. Soc. London, Ser. A **392**, 45 (1984).
- [28] I. Bialynicki-Birula, Z. Bialynicka-Birula, Phys. Rev. D **35**, 2383 (1987).

## ON THE GAUGE TRANSFORMATIONS IN CLASSICAL MECHANICS

V. I. Tretyak

*Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine,  
1 Svientsitskii Str., Lviv, UA-290011, Ukraine*

A rule for constructing the Lagrangian which ensures gauge invariance under an arbitrary Lie group is proposed for the classical mechanical system with  $n$  degrees of freedom.