

ДО ТЕОРІЇ НЕЛІНІЙНОЇ ДИСПЕРСІЇ ХВИЛЬОВИХ ПАКЕТІВ У МЕТОДІ БАГАТЬОХ МАСШТАБІВ

В. П. Лукомський, Ю. В. Седлецький

*Інститут фізики Національної академії наук України,
просп. Науки, 46, Київ, 03039, Україна*

(Отримано 12 лютого 2001 р.; в остаточному вигляді — 31 липня 2001 р.)

Досліджено еволюцію в часі спектрально вузького хвильового пакета в слабконелінійному середовищі, що описується нелінійним рівнянням Кляйна–Гордона з поліноміяльною нелінійністю. Методом багатьох масштабів побудовано асимптотичний розклад розв'язку до ϵ^5 включно. Цей розклад визначається комплексною функцією, що має зміст амплітуди першої гармоніки розв'язку, яка задовільняє нелінійне еволюційне рівняння Шредингера вищого порядку.

Ключові слова: нелінійне рівняння Шредингера, метод багатьох масштабів, нелінійне рівняння Кляйна–Гордона, солітон, асимптотичний розклад.

PACS number(s): 05.45.-a

Нелінійне рівняння Шредингера (НРШ) описує по-вільну еволюцію комплексної обвідної імпульсу з високочастотним заповненням у слабконелінійному дисперсійному середовищі. У найнижчому порядку при врахуванні тільки кубічної нелінійності й піарabolічної лінійної дисперсії НРШ використовується для дослідження різноманітних фізичних систем і на цю пору набуло загальнофізичного значення. Існує декілька асимптотичних методів його виводу, які ґрунтуються на припущенням слабкої нелінійності системи. Це передусім метод Крилова–Боголюбова–Митропольського (КБМ) [1], спектральний метод [2–4], метод багатьох масштабів (МБМ) [5, 6], метод усередненого лагранжіана [7]. Найбільшого поширення в застосуваннях набув МБМ. Водночас останніми роками актуальними стали дослідження поширення ультракоротких імпульсів немалої амплітуди. Так, у техніці волокнисто-оптичного зв'язку для промислової передачі ущільнених інформаційних потоків виникає необхідність застосовувати ультракороткі імпульси. Щоб уникати їх розплівання у зв'язку зі збільшенням дисперсії, потрібно збільшувати їхні амплітуди [8, 9]. Отже, актуальним є урахування наступних нелінійних і дисперсійних членів у відповідних еволюційних рівняннях, які дістали назву НРШ вищих порядків [10–14].

Незважаючи на широке використання МБМ, авторам невідомі опубліковані праці, де цим методом було отримано НРШ вищого порядку. Водночас такі рівняння були отримані іншими методами [3, 8, 4]. Як видно з методичних праць [5, 6], причина полягає в тому, що до цих пір не сформовано однозначного тлумачення алгоритму обчислення наступних членів в НРШ вищих порядків. У цій праці на класичному прикладі рівняння Кляйна–Гордона з поліноміяльною нелінійністю подано послідовну процедуру побудови асимптотичного розкладу й виводу НРШ в довільному порядку за малим параметром для комплексної обвідної хвильового пакета.

Розглянемо поширення квазімохроматичного хвильового пакета достатньо малої, але скінченної амплітуди, що описується узагальненим нелінійним рівнянням Кляйна–Гордона з поліноміяльною нелінійністю степеня $P \geq 2$

$$\phi_{tt} - c^2 \phi_{xx} + \sum_{p=1}^P \alpha_p \phi^p = 0, \quad (1)$$

де c^2 , α_p — дійсні числа, $\alpha_1 > 0$. З огляду на слабку нелінійність задачі подамо розв'язок у формі асимптотичного ряду за степенями малого нелінійного параметра ϵ

$$\phi(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} \epsilon^n \phi^{(n)}(t, x). \quad (2)$$

Наявність малих нелінійних доданків в (1), а також квазімохроматичність хвильового пакета із значенням частоти-носія ω і хвильового вектора k передбачають існування двох різних масштабів t_0 і $\tau = \epsilon t_0$ зміни поля в часі і відповідно $-x_0$ і $\xi = \epsilon x_0$ у просторі. Тоді часова і просторова похідні розв'язку також мають бути записані у вигляді двох доданків за змінними t_0 , τ і x_0 , ξ відповідно

$$\phi_t = \phi_{t_0} + \epsilon \phi_{\tau}, \quad \phi_x = \phi_{x_0} + \epsilon \phi_{\xi}. \quad (3)$$

Далі побудова асимптотичного розв'язку (2) залежить від постановки початкових і граничних умов для рівняння (1). Вивчім початкову задачу: при $t = 0$ на всій осі $x \in (-\infty; \infty)$ задана функція

$$\phi(x_0, \xi, 0) = A(\xi, 0) \exp(-ikx_0) + k.c. \quad (1a)$$

з розділеними просторовими змінними і необхідно визначити похідну комплексної обвідної ϕ_τ через значення самої функції та її похідних за ξ . Очевидно, що для крайової задачі змінні x і t міняються місцями. Як відомо [6], основна ідея МБМ полягає в тому, що похідна $\phi_\tau(\xi, \tau)$ зображення асимптотичним рядом

$$\phi_\tau = \sum_{n=1}^{\infty} \epsilon^{n-1} \phi_{t_n}, \quad (4)$$

де похідні ϕ_{t_n} становляють собою внесок у вислідну похідну членів порядку ϵ^n , а змінні $t_n = \epsilon^{n-1} \tau$ вважаються незалежними.

Після підстановки (2–4) в основне рівняння (1) і прирівнювання коефіцієнтів при однакових степенях ϵ^n отримуємо для $n = 1, 2, \dots$

$$(\hat{D}_0 + \alpha_1) \phi^{(n)} = - \sum_{n'=1}^{n-1} \hat{D}_{n'} \phi^{(n-n')} - \sum_{p=2}^{\min(n, P)} \alpha_p \sum_{n'=p-1}^{n-1} (\phi^{p-1})^{(n')} \phi^{(n-n')}, \quad (5)$$

де введено позначення

$$\begin{aligned} \hat{D}_0 &= \frac{\partial^2}{\partial t_0^2} - c^2 \frac{\partial^2}{\partial x_0^2}, \\ \hat{D}_1 &= 2 \frac{\partial^2}{\partial t_0 \partial t_1} - c^2 \frac{\partial^2}{\partial x_0 \partial \xi}, \\ \hat{D}_2 &= 2 \frac{\partial^2}{\partial t_0 \partial t_2} + \frac{\partial^2}{\partial t_1^2} - c^2 \frac{\partial^2}{\partial \xi^2}, \dots, \\ \hat{D}_{n>2} &= \sum_{n'=1}^{n-1} 2 \frac{\partial^2}{\partial t_0 \partial t_n} + \frac{\partial^2}{\partial t_{n'} \partial t_{n-n'}}. \end{aligned}$$

Із першого з рівнянь (5) випливає, що, як і в початковий момент $t = 0$, швидкі й повільні змінні розділяються

$$\phi^{(1)}(x, t) = A(t_1, t_2, \dots, \xi) \exp^{i\theta} + k.c.,$$

$$\theta = \omega t_0 - k x_0, \quad (6)$$

де

$$\omega = \pm \sqrt{c^2 k^2 + \alpha_1} \quad (7)$$

— закон дисперсії лінеаризованої задачі.

Надалі розглянемо тільки хвилю, яка поширюється в додатному напрямку осі x , що відповідає знакові “+” у законі дисперсії (7). Підставмо (6) в рівняння (5) при $n = 2$. Відсутність секулярних членів у розв'язку $\phi^{(2)}$ (відсутність першої гармоніки у

правій частині рівняння) забезпечується умовою

$$A_{t_1} = -\omega^{(1)} A_\xi, \quad \omega^{(n)} = \frac{\partial^n \omega}{\partial k^n}; \quad (8)$$

$\omega^{(1)}$ — групова швидкість. Частинний розв'язок неоднорідного рівняння

$$\begin{aligned} \phi^{(2)} &= b_0^{(2)} |A|^2 + b_2^{(2)} (A^2 \exp^{2i\theta} + k.c.), \\ b_0^{(2)} &= -\frac{2\alpha_2}{\alpha_1}, \quad b_2^{(2)} = \frac{\alpha_2}{3\alpha_1}. \end{aligned} \quad (9)$$

Цей розв'язок відповідає генерації нульової і другої гармонік на нелінійності при поширенні плоскої хвилі (6).

При $n = 3$ відповідно маємо умову відсутності першої гармоніки в правій частині (5)

$$\begin{aligned} i A_{t_2} &= -\frac{1}{2\omega} (A_{t_1 t_1} - c^2 A_{\xi \xi}) - q_3 |A|^2 A, \\ q_3 &= \frac{1}{2\omega} \left(3\alpha_3 - \frac{10}{3} \frac{\alpha_2^2}{\alpha_1} \right) \end{aligned} \quad (10)$$

і частинний розв'язок неоднорідного рівняння для $\phi^{(3)}$

$$\phi^{(3)} = b_3^{(3)} A^3 \exp 3i\theta + k.c., \quad b_3^{(3)} = \frac{\alpha_2^2}{12\alpha_1^2} + \frac{\alpha_3}{8\alpha_1}. \quad (11)$$

Продовжуючи процедуру для $n = 4, 5, \dots$, кожного разу знаходимо наступне наближення $\phi^{(n)}$ як суму гармонік до n включно, а з умови відсутності секулярності в розв'язку $\phi^{(n)}$ — значення похідної A_{t_n} через значення попередніх похідних $A_{t_{n-1}}, \dots, A_{t_1}$.

Обмежуючись значенням $n = 5$, асимптотичний розклад розв'язку (2) зобразимо як обрізаний ряд Фур'є

$$\phi = \epsilon^2 \phi_0(\tau, \xi) + \sum_{n=1}^5 (\epsilon^n \phi_n(\tau, \xi) \exp(in\theta) + k.c.), \quad (12)$$

де

$$\begin{aligned} \phi_0 &= b_0^{(2)} |A|^2 + \epsilon^2 (b_0^{(4)} |A|^4 - \frac{2\alpha_2}{\alpha_1^2} \omega \omega^{(2)} \frac{\partial |A|^2}{\partial \xi}), \\ \phi_1 &= A(\xi, \tau), \\ \phi_2 &= b_2^{(2)} A^2 + \epsilon^2 [b_2^{(4)} |A|^2 A^2 \\ &\quad - \frac{2\alpha_2}{9\alpha_1^2} \omega \omega^{(2)} (3AA_{\xi \xi} + A_\xi^2)], \\ \phi_3 &= b_3^{(3)} A^3 + \epsilon^2 [b_3^{(5)} |A|^2 A^3 \end{aligned} \quad (13)$$

$$\begin{aligned}
 & + \frac{3\omega\omega^{(2)}}{32\alpha_1^2} (\alpha_- A^2 A_{\xi\xi} - \alpha_+ A A_{\xi\xi}^2)], \\
 \phi_4 &= b_4^{(4)} A^4, \quad \phi_5 = b_5^{(5)} A^5, \\
 \alpha_- &= \alpha_3 - \frac{5\alpha_2^2}{4\alpha_1}, \quad \alpha_+ = \alpha_3 + \frac{34\alpha_2^2}{27\alpha_1}, \\
 b_4^{(4)} &= \frac{\alpha_2^3}{54\alpha_1^3} + \frac{\alpha_2\alpha_3}{60\alpha_1^2} + \frac{\alpha_4}{15\alpha_1}, \\
 b_5^{(5)} &= \frac{5\alpha_2^4}{1296\alpha_1^4} + \frac{5\alpha_2^2\alpha_3}{144\alpha_1^3} + \frac{11\alpha_2\alpha_4}{180\alpha_1^2} + \frac{\alpha_3^2}{64\alpha_1^2} + \frac{\alpha_5}{24\alpha_1}, \\
 b_3^{(5)} &= \frac{237\alpha_2^4}{432\alpha_1^4} - \frac{61\alpha_2^2\alpha_3}{\alpha_1^3} - \frac{3\alpha_2\alpha_4}{20\alpha_1^2} - \frac{21\alpha_3^2}{64\alpha_1^2} + \frac{5\alpha_5}{8\alpha_1}, \\
 b_0^{(4)} &= -\frac{38\alpha_2^3}{9\alpha_1^3} + \frac{10\alpha_2\alpha_3}{\alpha_1^2} - \frac{6\alpha_4}{\alpha_1}, \\
 b_2^{(4)} &= \frac{59\alpha_2^3}{54\alpha_1^3} - \frac{31\alpha_2\alpha_3}{12\alpha_1^2} + \frac{4\alpha_4}{3\alpha_1}.
 \end{aligned}$$

Залежність амплітуд гармонік розв'язку (12–13) від повільних змінних τ, ξ є неявною: $\phi_n = \phi_n(A, A^*, A_\xi, \dots)$. Еволюційне рівняння для комплексної обвідної $A(\xi, \tau)$ установлюємо шляхом обчислення похідної A_τ як суми всіх похідних A_{t_n} , знайдених з умов несекулярності розв'язку (8), (10) і т.д.

$$\begin{aligned}
 & i(A_\tau + \omega^{(1)} A_\xi) + \epsilon \left(-\frac{\omega^{(2)}}{2!} A_{\xi\xi} + q_3 |A|^2 A \right) \\
 & - i\epsilon^2 \left(\frac{\omega^{(3)}}{3!} A_{\xi\xi\xi} + \frac{\omega^{(1)} q_3}{\omega} (|A|^2 A)_\xi \right) \\
 & + \epsilon^3 \left(\frac{\omega^{(4)}}{4!} A_{\xi\xi\xi\xi} + b_{200} A^2 A_{\xi\xi}^* + b_{220} |A|^2 A_{\xi\xi} \right. \\
 & \left. + b_{210} A |A_\xi|^2 + b_{221} A^*(A_\xi)^2 + q_5 |A|^4 A \right) = 0, \quad (14)
 \end{aligned}$$

де $\omega^{(n)}$, q_3 визначені у формулах (8), (10) і, крім того,

$$q_5 = \frac{1}{2\omega} \left(-\frac{\alpha_2^4}{\alpha_1^3} \left(\frac{335}{54} + \frac{25}{9} \frac{\alpha_1}{\omega^2} \right) + \frac{\alpha_2^2\alpha_3}{\alpha_1^2} \left(\frac{157}{6} + \frac{5\alpha_1}{\omega^2} \right) \right)$$

$$\begin{aligned}
 & + \frac{3\alpha_3^2}{8\alpha_1} \left(1 - \frac{6\alpha_1}{\omega^2} \right) - \frac{84}{3} \frac{\alpha_2\alpha_4}{\alpha_1} + 10\alpha_5 \Big), \quad (15) \\
 b_{200} &= - \left(\frac{\omega^{(1)}{}^2}{\omega^2} q_3 + \frac{2\alpha_2^2}{\alpha_1^2} \omega^{(2)} \right), \\
 b_{220} &= \frac{-2\omega^{(1)}{}^2 + \omega\omega^{(2)}}{\omega^2} q_3 - \frac{16\alpha_2^2}{9\alpha_1^2} \omega^{(2)}, \\
 b_{210} &= \frac{\omega\omega^{(2)} - 4\omega^{(1)}{}^2}{\omega^2} q_3 - \frac{4\alpha_2^2}{\alpha_1^2} \omega^{(2)}, \\
 b_{221} &= \frac{\omega\omega^{(2)} - 4\omega^{(1)}{}^2}{2\omega^2} q_3 - \frac{2\alpha_2^2}{9\alpha_1^2} \omega^{(2)}.
 \end{aligned}$$

Параметр розкладу ϵ формальним, тому у формулах (12–14) можна покласти $\epsilon = 1$.

Таким чином, еволюція спектрально вузького хвильового пакета в слабконелінійному наближенні з точністю ϵ^5 при початковій умові (1a) може бути описана, замість рівняння (1), простішим рівнянням (14). Процедуру редукції легко узагальнити для системи нелінійних диференціальних рівнянь. Границний випадок нелінійного осцилятора ($c = 0$) переводить рівняння (1) в узагальнене рівняння Дюффінга. Еволюція комплексної амплітуди (14) визначається при цьому тільки нелінійними членами з коефіцієнтами q_3 , q_5 , які були незалежно обчислені в [15].

Було також показано, що для рівняння Кляйна–Гордона (1) з кубічною неліністю ($\alpha_2 = 0, \alpha_4 = 0, \alpha_5 = 0$) розклад точного розв'язку у вигляді еліптичної функції при початковій умові (1a) в заданому порядку за параметром ϵ точно збігається з розкладом (12), отриманим методом багатьох масштабів. Видно, що при врахуванні тільки членів порядку ϵ^3 рівняння (14) переходить у класичне НРШ [6, 7], тоді як вищі порядки описують явища нелінійної дисперсії. Крім того, при деяких співвідношеннях між коефіцієнтами α_p відбувається якісна зміна характеру еволюції комплексної обвідної. Зокрема, при $q_3 = 3\alpha_3 - \frac{10\alpha_2^2}{3\alpha_1} = 0$ особливості еволюції визначаються тільки балансом лінійних і нелінійних дисперсійних членів.

Ця робота була частково підтримана грантом INTAS N99–1637.

-
- [1] Ю. А. Митропольский, *Нелинейная механика. Одночастотные колебания*. (Ин-т математики НАН Украины, Киев, 1997).
- [2] В. Е. Захаров, Прикладная механика и техническая физика № 2, 86 (1968).
- [3] А. Г. Литвак, В. И. Таланов, Изв. вузов, радиофизика **10**, 539 (1967).
- [4] В. П. Лукомский, Журн. эксп. теор. физ. **108**, вып. 2(8), 567 (1995).
- [5] T. Kawahara, J. Phys. Soc. Jpn **35**, 1537 (1973).
- [6] Р. Додд, Дж. Эйлбек, Дж. Гіббон, Х. Моррис, *Солитоны и нелинейные волновые уравнения* (Мир, Москва, 1972).
- [7] H. C. Yuen, B. M. Lake, Phys. Fluids **18**, 956 (1975).
- [8] Y. Kodama, A. Hasegawa, IEEE J. Quantum Electron. **23**, No. 5, 510 (1987).

- [9] Z. Li, L. Li, H. Tian, G. Zhou, Phys. Rev. Lett. **84**, No. 18, 4096 (2000).
- [10] K. Trulsen, K. Dysthe, J. Fluid Mech. **352**, 359 (1997).
- [11] K. Trulsen, I. Kliakhandler, K. Dysthe, M. Velarde, Phys. Fluids, **12**, No. 10, 2432 (2000).
- [12] F. Dias, C. Kharif, Annual Rev. Mech. **31**, 301 (1999).
- [13] P. Christodoulides, F. Dias, Phys. Fluids **7**, No. 12, 3013 (1995).
- [14] H. Doebner, G. Goldin, P. Nattermann, J. Math. Phys. **40**, 49 (1999).
- [15] V. P. Lukomsky, V. B. Bobkov, Nonl. dynamics **16**, 1 (1998).

**ON THE THEORY OF THE NONLINEAR DISPERSION OF WAVE
PACKETS IN THE MULTIPLE SCALES METHOD**

V. P. Lukomskii, Yu. V. Sedletskii

*Institute of Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine
46 Nauky Pr., Kyiv, UA-03039, Ukraine*

The time evolution of spectrally narrow wavetrain that is described by the nonlinear Klein–Gordon equation is investigated in weakly nonlinear medium. The asymptotic expansion of a solution is built by the method of multiple scales up to ϵ^5 inclusive. This expansion is defined by a complex function that has the sense of the first harmonic of a solution which satisfies the nonlinear evolutionary Schrödinger equation of a higher order.